CANARD NOIR
American Black Duck
Anas rubripes

- NICHEUR MIGRATEUR COMMUN
- AIRE : EN CONTRACTION ?
- EFFECTIFS : EN DIMINUTION

Michel Bordeleau

Le Canard noir arrive en tête du palmarès des espèces de sauvagine repérées dans le plus grand nombre de parcelles au cours du présent atlas. Malgré cette position enviable, ses effectifs peinent à remonter aux niveaux des années 1950. Son aire de reproduction ne s'étend essentiellement que du nord du Manitoba aux provinces de l'Atlantique et au nord-est des États-Unis. Fait notable, le Québec héberge possiblement plus de la moitié des effectifs nicheurs à l'échelle mondiale (Bordage, 2013a).

RÉPARTITION ET EFFECTIFS

Présent dans 42 % des parcelles visitées, le Canard noir a été confirmé nicheur dans toutes les régions du Québec méridional. Il faut dire qu'il se reproduit dans une grande variété de milieux humides et aquatiques, allant des petits étangs et ruisseaux aux marais d'eau douce ou salée, tourbières et grands lacs. De plus, il fréquente aussi bien les secteurs ouverts que boisés. Les seuls endroits où ce canard barboteur est plus rare à l'échelle de l'aire d'étude sont les hauteurs du massif gaspésien et les zones d'agriculture intensive.

Les densités culminent dans la Forêt mixte boréale (RCO 12), y dépassant les 30 couples/100 km^2. Encore élevées dans la Forêt coniférienne boréale (RCO 8; 19 couples/100 km^2), elles faiblissent un peu dans la Plaine du Saint-Laurent et la Forêt septentrionale de l'Atlantique (RCO 13 et 14; 16 et 14 couples/100 km^2 respectivement) (SCF, donn. inéd.). Au nord du Saint-Laurent, le Canard noir est de loin l'espèce de sauvagine la plus abondante, étant deux fois plus nombreux que le Fuligule à collier, son plus proche rival. C'est au sud du Saint-Laurent qu'il cède sa place au Canard colvert (Lepage *et al.*, 2015).

SITUATION

La proportion de parcelles dans lesquelles le Canard noir a été signalé a subi une baisse de 12 % d'un atlas à l'autre. En parallèle, les inventaires du SCF font état d'une diminution du nombre de couples nicheurs de 2 % par année de 2000 à 2016 dans les RCO 12 et 8, et de 1 % par année de 2004 à 2016 dans la RCO 13 (SCF, donn. inéd.). Dans cette dernière RCO, les paysages composés de cultures annuelles (p. ex. maïs, soya) ne conviennent pas à l'espèce – faute de milieux humides pour l'élevage des canetons (Maisonneuve *et al.*, 2000) –, mais les cultures pérennes (p. ex. pâturages, cultures fourragères) et les secteurs agroforestiers sont favorables à sa nidification (Maisonneuve *et al.*, 2006). Or depuis l'époque du premier atlas, plus de 75 % des cultures pérennes ont été remplacées par des cultures annuelles dans les Basses-terres du Saint-Laurent (chapitre 4). Quant au recul des effectifs québécois observé dans les Forêts mixte et coniférienne boréales, il est difficile d'en cerner les causes. Chose certaine, les baisses de populations du Canard noir semblent généralisées, car les provinces et États limitrophes en présentent de semblables (Swift, 2008a; Ross, 2010a; Strong, 2013a; Horn, 2015a).

Le Canard noir reçoit une attention toute spéciale : ses effectifs nicheurs sont suivis annuellement, des recherches ciblent la dynamique de ses populations et sa chasse est étroitement surveillée puisqu'il s'agit d'une espèce gibier particulièrement prisée par les chasseurs. Malgré cela, on doit reconnaître que ses populations ont déjà été plus nombreuses. Si l'on veut que cet oiseau retrouve son lustre d'antan, il faudrait à tout le moins mettre un frein à la dégradation et à la perte continue de milieux humides, sur ses aires de nidification comme dans ses quartiers d'hiver, puisqu'il s'agit là d'une cause de déclin faisant consensus chez les scientifiques (Longcore *et al.*, 2000).

Christine Lepage

FICHE TECHNIQUE

	1984-1989	2010-2014
NIDIFICATION POSSIBLE	278	618
NIDIFICATION PROBABLE	279	353
NIDIFICATION CONFIRMÉE	617	718
PARCELLES AVEC OBSERVATION	**1174**	**1689**
PROPORTION DES PARCELLES VISITÉES	**47,7 %**	**41,9 %**
POINTS D'ÉCOUTE (NOMBRE)	S.O.	144
POINTS D'ÉCOUTE (ÉLÉVATION EN MÈTRES)	S.O.	2-820

INDICES DE NIDIFICATION



DOMAINES BIOCLIMATIQUES (parcelles avec observation; %)



INDICES DE NIDIFICATION (meilleur indice par parcelle; %)



Christian Marcotte

La forêt boréale québécoise abrite une large part des effectifs mondiaux du Canard noir. Cela dit, cet oiseau était jadis plus commun au Québec.