GOÉLAND MARIN
Great Black-backed Gull
Larus marinus

- NICHEUR RÉSIDENT PEU COMMUN
- AIRE: STABLE
- EFFECTIFS: EN DIMINUTION?

Suzanne Labbé

Audubon écrivait à propos du Goéland marin: «[...] rauques et puissants, ses cris retentissent et portent l'épouvante en bas, parmi les multitudes emplumées.» De fait, sa grande taille et son tempérament agressif font de ce goéland un prédateur redoutable qui s'attaque régulièrement aux couvées d'Eiders à duvet et qui peut avoir des effets dévastateurs sur celles d'oiseaux marins plus vulnérables, comme les sternes.

L'aire de reproduction du Goéland marin couvre les côtes du nord-est de l'Amérique du Nord, du sud du Groenland et de l'Europe de l'Ouest. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'espèce niche depuis la Caroline du Nord jusqu'à l'extrémité nord du Québec ainsi que tout le long du Saint-Laurent jusqu'aux Grands Lacs (Weseloh, 2010).

RÉPARTITION ET EFFECTIFS

On trouve le Goéland marin sur les îles et les côtes de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, jusque sur la Basse-Côte-Nord, en Gaspésie ainsi qu'aux îles de la Madeleine, où sa nidification a été confirmée dans la quasi-totalité des parcelles. L'espèce niche à l'île d'Anticosti et dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent, mais peu de preuves de nidification y ont été obtenues. On estime à moins de 10 000 le nombre de Goélands marins qui se reproduisent de nos jours dans les eaux côtières du Québec méridional. De ce nombre, environ 65 % et 35 % nichent respectivement dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Le tronçon fluvial abriterait quant à lui une dizaine de couples seulement (SCF, donn. inéd.).

Le lac Saint-Jean demeure le seul endroit connu à l'intérieur des terres où le Goéland marin niche régulièrement. Un nid y avait été découvert durant la campagne de terrain du premier atlas et quelques indices de nidification de niveau *probable* ou *confirmé* se sont ajoutés durant celle du deuxième. Entre les deux atlas, on avait aussi noté la présence d'un couple nicheur au lac Kénogami (Aubry et Bannon, 1996a). Cependant, un adulte était présent sur la rivière Saint-François (dans les Cantons-de-l'Est) pendant la campagne du présent atlas, là même où un nid avait été trouvé à l'époque du premier atlas; l'espèce niche donc peut-être aussi à ce deuxième endroit éloigné du Saint-Laurent.

SITUATION

La répartition du Goéland marin dans le Québec méridional n'a pas beaucoup changé depuis l'époque du premier atlas. La probabilité d'observation de l'espèce est demeurée stable dans la portion fluviale du Saint-Laurent, mais a diminué dans l'estuaire et le golfe. C'est en Minganie (incluant Anticosti) et sur les côtes orientale et méridionale de la Gaspésie que cette probabilité a le plus diminué.

Les inventaires des laridés effectués par le SCF depuis plusieurs décennies dans le sud du Québec révèlent une diminution du nombre de Goélands marins. Ces baisses de population varient dans le temps et selon les régions. Ainsi, depuis le début des années 2000, les effectifs de l'espèce ont diminué sur la Côte-Nord (-37 %), en Gaspésie (-22 %) et dans l'estuaire (-26 %). Aux îles de la Madeleine, la population a chuté de 60 %, le nombre d'individus nicheurs étant passé d'environ 2 500 en 1990 à moins de 1 000 en 2012 (Cotter *et al.*, 2012; SCF, donn. inéd.). Les raisons avancées pour expliquer cette décroissance sont une meilleure gestion des déchets domestiques et la réduction des volumes de rejets et de déchets de poisson faisant suite aux moratoires imposés pour certaines pêches commerciales, notamment celle de la morue. Par ailleurs, les changements des conditions environnementales en milieu marin ont peut-être aussi affecté la disponibilité d'espèces fourrage pour le Goéland marin, réduisant du même coup son succès de reproduction.

Guy Michaud

FICHE TECHNIQUE

	1984-1989	2010-2014
NIDIFICATION POSSIBLE	112	132
NIDIFICATION PROBABLE	30	17
NIDIFICATION CONFIRMÉE	101	91
PARCELLES AVEC OBSERVATION	**243**	**240**
PROPORTION DES PARCELLES VISITÉES	**9,9 %**	**6,0 %**
POINTS D'ÉCOUTE (NOMBRE)	S.O.	122
POINTS D'ÉCOUTE (ÉLÉVATION EN MÈTRES)	S.O.	1-103

INDICES DE NIDIFICATION



PROBABILITÉ D'OBSERVATION

1984-1989



2010-2014



Variation



INDICES DE NIDIFICATION (meilleur indice par parcelle; %)



DOMAINES BIOCLIMATIQUES (parcelles avec observation; %)



Alain Richard

Prédateur redoutable, le Goéland marin possède un régime alimentaire varié.