CORMORAN À AIGRETTES

Double-crested Cormorant
Phalacrocorax auritus

- NICHEUR MIGRATEUR COMMUN LOCALEMENT
- AIRE: EN EXTENSION
- EFFECTIFS: EN AUGMENTATION

Philippe Henry

Longtemps persécuté avant l'adoption de lois protégeant les oiseaux, le Cormoran à aigrettes continue d'avoir mauvaise réputation. Mais alors qu'il effectue un retour en force dans toute l'aire qu'il occupait autrefois – centre du continent, Grands Lacs et côtes de l'Atlantique et du Pacifique –, certaines populations nicheuses, considérées surabondantes, font l'objet de tentatives d'éradication controversées. De plus, dans le sud-est des États-Unis où nos cormorans hivernent, on les accuse de déprédation dans les piscicultures. Point de répit, donc, pour ce mal-aimé!

RÉPARTITION ET EFFECTIFS

Durant les travaux du présent atlas, près de 150 cormorandières ont été repérées dans le Québec méridional. Les deux tiers se trouvent dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, où plusieurs comptent des centaines de nids et quelques-unes plus de mille. L'espèce a également commencé à nidifier à plusieurs endroits dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent, le long de l'Outaouais et dans les Basses-terres de l'Abitibi, s'invitant parfois dans des héronnières, comme en Haute-Mauricie où une colonie isolée s'est établie au lac Wayagamac. Dans quelques secteurs, les cormorans ont toutefois dû déménager en réponse au dérangement (prédation, contrôle des populations). Il faut savoir que, sur les îles où il installe ses nids, le Cormoran à aigrettes détruit la végétation et évince d'autres oiseaux coloniaux, dont le Grand Héron et l'Eider à duvet. On l'accuse aussi – souvent à tort – de décimer certains stocks de poissons d'intérêt sportif ou commercial (Wires, 2015).

On a confirmé la nidification de ce cormoran dans 27 % des parcelles où il a été rapporté. Ce faible ratio (pour une espèce coloniale) s'explique sans doute par l'observation d'oiseaux dans des parcelles où ils ne nichent pas: individus non reproducteurs ou aperçus alors qu'ils s'alimentaient à distance de leurs colonies.

SITUATION

Profitant de conditions favorables (disponibilité de nouvelles sources de nourriture, baisse des quantités de contaminants, etc.), le Cormoran à aigrettes a vu sa population exploser à l'échelle continentale depuis les années 1970 (Dorr *et al.*, 2014). Au Québec, le nombre de couples nicheurs dans les colonies du golfe et de l'estuaire est passé d'environ 22 000 en 1988-1990 (Alvo, 1995a) à près de 28 000 en 2016 (J.-F. Rail, comm. pers.). Des mesures de contrôle, mises en place dans le cadre d'un programme visant à préserver l'habitat de l'Eider à duvet, sont cependant parvenues à faire diminuer le nombre de nids dans l'estuaire entre 1989 et 1993 (Bédard *et al.*, 1997).

Depuis l'époque du premier atlas, l'espèce a étendu sa présence en eau douce, spécialement en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, le long du Richelieu et autour du lac Saint-Pierre. Sur ce plan d'eau, le nombre de nids a bondi de quatre seulement en 1991 à près de 1 000 en 2004, avant que des essais d'éradication visant à protéger les stocks de Perchaude ne renversent la tendance à partir de 2008 (MRN, 2013b). Malgré tout, la multiplication des colonies intérieures et côtières s'est poursuivie d'un atlas à l'autre, mais sans que l'espèce ne devienne ici aussi abondante que sur les Grands Lacs.

Les mesures locales de gestion des populations prises par plusieurs États et provinces (dont le Québec) sont trop récentes pour qu'on puisse en mesurer l'impact à long terme (Dorr *et al.*, 2014). De plus, en l'absence d'actions concertées, les cormorans vont tout simplement s'établir ailleurs après avoir été chassés d'un site (Picard, 2006). Sans conteste, le Cormoran à aigrettes est un oiseau résilient, et tout indique qu'il devrait continuer de gagner du terrain.

Daniel Toussaint

FICHE TECHNIQUE

	1984-1989	2010-2014
NIDIFICATION POSSIBLE	131	283
NIDIFICATION PROBABLE	28	15
NIDIFICATION CONFIRMÉE	60	111
PARCELLES AVEC OBSERVATION	**219**	**409**
PROPORTION DES PARCELLES VISITÉES	**8,9 %**	**10,1 %**
POINTS D'ÉCOUTE (NOMBRE)	S.O.	108
POINTS D'ÉCOUTE (ÉLÉVATION EN MÈTRES)	S.O.	1-303

INDICES DE NIDIFICATION



DOMAINES BIOCLIMATIQUES (parcelles avec observation; %)



INDICES DE NIDIFICATION (meilleur indice par parcelle; %)



Christian Marcotte

Les deux tiers des quelque 150 cormorandières du Québec méridional se trouvent dans le golfe ou l'estuaire du Saint-Laurent. Île Bicquette.